

*Artur Tabor, Jacek Tabor*

### **NIETYPOWY PRZYPADEK POLOWANIA CZAPLI SIWEJ *ARDEA CINEREA***

Podczas prowadzenia w dniu 31 XII 2005 obserwacji ornitologicznych nad Wisłą pod Wilczkowicami (pow. kozienicki, woj. mazowieckie), zaobserwowano nietypowe zachowanie czapli siwej. Pojedynczy osobnik żerował na częściowo zamrożonej odnodze Wisły, łamiąc lód poprzez uderzenie z powietrza swoim ciałem (fot. 4). Zaobserwowano 2 takie przypadki, a na całej odnodze znajdowało się łącznie 15 częściowo zamrożonych otworów żerowiskowych. Odnoga o całkowitej powierzchni ok. 0,16 ha, była zamrożona tylko w naj płytszej części o głębokości ok. 30-40 cm. Głębokość taka jest optymalna dla żerowania czapli w pozycji umożliwiającej czatowanie. Rozbijanie lodu odbywało się w czasie przelotu nad odnogą. Ptak lekko wychylał się ku górze, po czym z wysokości ok. 5 m spadał z wysuniętymi nogami i rozbił lód. Grubość lodu wynosząca 3-5 mm umożliwiała czapli jego rozbicie podczas jednej próby, jednocześnie przypuszczalnie uniemożliwiała bezpośrednie poruszanie się po nim. Po rozbiciu lodu ptak przebywał w otworze ok. 10 minut. W czasie prowadzenia obserwacji nie stwierdzono złodzenia głównego nurtu Wisły. Polowanie odbywało się przy temperaturze 0°C i ok. 20 cm pokrywie śnieżnej.

W literaturze brak jest doniesień o takim sposobie żerowania czapli siwej (np. Cramp 1998, Milstein *et al.* 1970).

### **Literatura**

Cramp S. 1998. *The Complete Birds of the Western Palearctic on CD-ROM*. Oxford University Press, Optimedia.

Milstein P. L., Prestt I., Bell A. A. 1970. *The breeding cycle of the Grey Heron*. *Ardea* 58: 171-257.

**Adresy autorów:**

Artur Tabor, ul. Stawowa 2, 26-630 Jedlnia-Letnisko, e-mail: poczta@arturtabor.pl

Jacek Tabor, Spalski Park Krajobrazowy, u. Podleśna 2, Spała, 97-215 Inowłódz, e-mail: jacektabor@poczta.onet.pl

**ATYPICAL HUNTING BY THE GREY HERON *ARDEA CINEREA*****Summary**

On 31 December 2005, we observed a foraging Grey Heron *Ardea cinerea* breaking ice with its own body on a Vistula arm near Wilczkowice (Kozienice county). Two such cases were observed. Along the whole partly ice-free arm, there were 15 foraging holes. Breaking of the ice 3-5 mm thick took place in flight.



Fot. 4. Żerująca czapla siwa *Ardea cinerea* w odnodze Wisły, 31 XII 2005 (fot. A. Tabor)

A Grey Heron *Ardea cinerea* foraging on a Vistula arm on 31 December 2005 (Photo by A. Tabor)