

CZĘSTOŚĆ TRICHOMONADOZY U DZIEWCZĄT, MIESZKANEK WROCŁAWIA I WOJEWÓDZTWA WROCŁAWSKIEGO

ELŻBIETA GORZĘDOWSKA i STEFAN WACHNIK

Dolnośląski Zespół Specjalistyczny Medycyny Wieku Rozwojowego,
Konsultacyjna Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt, Wrocław
Poradnia „K” Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Prusicach, Wrocław

Materiał i wyniki badań

Okres badań obejmuje 13 lat (1962-1974 włącznie). Dotyczy dziewcząt do 18 roku życia zgłaszających się do naszej poradni oraz mieszkających w internatach, Domach Dziecka, Pogotowiu Opiekuńczym, Państwowym Zakładzie Wychowawczym we Wrocławiu i Państwowym Młodzieżowym Zakładzie Wychowawczym w Sobótce. Wyniki badań przedstawiono w tabeli (uwzględniającej także dane z doniesienia poprzedniego [1]).

Zachorowalność na rzęsistkowicę wybitnie ulega zmniejszeniu z 8,2% w 1968 r., 6,3% w 1970 r., 3,2% w 1971 r. do 1,9% w 1974 r. (tabela).

Jak wynika z tabeli, zachorowalność na rzęsistkowicę od roku 1968 wykazuje ogólną tendencję spadkową. Wszystkie chore leczone były Metronidazolem doustnie i dopochwowo, w przypadku grzybicy stosowano dodatkowo Nystatynę dopochwowo. Zmniejszenie zachorowalności to naszym zdaniem skutek stosowania Metronidazolu, profilaktycznych badań córek, których matki zarażone były rzęsistkowicą, badań sondażowych, profilaktyce w okresie ciąży, większego uświadomienia i kultury sanitarnej kobiet.

Adres autorów:

50-330 Wrocław, Wieczorka 29/35

LITERATURA

1. Gorzędowska, E.: *Wiad. Parazytol.*, 15, 353, 1969.

TABELA

Zachorowalność na rzęsistkowicę dziewcząt do lat 18
na terenie miasta Wrocławia i woj. wrocławskiego
w latach 1962-1974

TABLE

Trichomonadosis of the girls 18 years old in Wrocław
and Wrocław voivodeship in 1962-1974

Rok Year	Ilość wymazów No. of smears	Liczba (%) wykry- tych zarażeń No. (%) of detected infections	
1962	833	63	(8.2)
1963			
1964	409	49	
1965	467	41	
1966	560	47	
1967	710	45	
1968	728	46	(6.3)
1969	825	48	(5.6)
1970	956	60	(6.3)
1971	919	30	(3.2)
1972	922	20	(2.2)
1973	841	11	(1.3)
1974	1278	25	(1.9)

TRICHOMONADOSIS IN GIRLS IN THE CITY OF WROCLAW AND IN THE WROCLAW VOIVODESHIP

by

E. GORZĘDOWSKA and S. WACHNIK

The morbidity with trichomonadosis was analysed in girls up to 18 years of age calling at the Consultative Gynecological Dispensary for Girls, as well as in those staying in various tutelar and educational boarding houses.

Including the paper presented at the Symposium in 1968, the research period comprises 13 years (1974 inclusive). Within that period the morbidity was found to decrease considerably (table).

The decline of morbidity is ascribed to the effectiveness of Metronidazole, prophylactic examinations of infected mothers, daughters, sounding examinations, prophylaxis during pregnancy, better consciousness and sanitary culture of women.