

## NOTATKI PRZYRODNICZE

### Owady

Mariusz Gwardjan, Paweł Piwko, Krzysztof Staroń

### NOWE GATUNKI KÓZKOWATYCH (*Coleoptera: Cerambycidae*) DLA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

W Górach Świętokrzyskich wykazano dotychczas pewne występowanie 99 gatunków kózkowatych (Śliwiński, Nowakowski 1990, Bidas 1998, Piwko 1998). W latach 1994–1999 stwierdzono sześć nowych gatunków.

*Nivelia sanguinosa* (Gyllenhal, 1827). 6 VI 1998 obserwowano 6 osobników na kwiatkach roślin baldaszkowatych *Umbelliferae* przy leśnej drodze około 500 m na wschód od rezerwatu „Dalejów” (UTM DB 85). Gatunek o zasięgu borealno-górskim, w Polsce notowany dotychczas w górach, Puszczy Białowieskiej oraz Puszczy Boreckiej.

*Monochamus sartor* (Fabricius, 1787). 31 VII 1997 stwierdzono liczne chrząszcze na „wałkach” świerkowych przy leśnej drodze w okolicach rezerwatu „Świnia Góra” (DB 75). Gatunek o zasięgu związanym z występowaniem świerka, w Polsce występujący głównie w górach i na pogórzu.

*Mesosa curculionoides* (Linnaeus, 1761). Gatunek odnotowany w Grzywach Korzeckowskich (DB 52), gdzie 4 VI 1998 obserwowano 3 osobniki na stosach gałęzi dębu bezszypułkowego *Quercus petraea*, a 6 III 1999 zebrano gałęzie dębu bezszypułkowego, z których w czerwcu 1999 r. wyhodowano 6 osobników dorosłych. Gatunek subpontyjsko-mediterranejski, w Polsce znany z rozproszonych stanowisk w całym kraju.

*Pogonocherus decoratus* (Fairmaire, 1855). 7 X 1996 obserwowano jednego osobnika na ścianie budynku na osiedlu „Czarnów” (Kielce, ok. 1000 m od rezerwatu „Karczówka”, DB 73). Gatunek europejski, występujący dość pospolicie w całym kraju.

*Pogonocherus fasciculatus* (de Geer, 1775). 30 V 1996 w Niwkach Dalezycznych w składnicy drewna (DB 82) odłowiono jednego latającego osobnika. Gatunek palearktyczny, występujący dość pospolicie w całym kraju.

*Stenostola dubia* (Laicharting, 1784). Gatunek stwierdzony na dwu stanowiskach: Święty Krzyż (EB 03) – 2 V 1994 1 osobnik na liściu osiki *Populus tremula*

oraz Zagrody (DB 63) - 28 V 1999 1 osobnik na liściu lipy szerokolistnej *Tilia platyphyllos*. Gatunek europejski, w Polsce spotykany głównie w południowej części kraju.

*Autorzy dziękują kol. Markowi Milkowskiemu za pomoc w oznaczaniu okazów.*

### Literatura

- Bidas M. (1997) 1998. *Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) nowe dla Gór Świętokrzyskich*. Wiad. Entom. 16: 232.
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1990. *Chrzęszcze – Coleoptera, Cerambycidae i Bruchidae*. Katalog Fauny Polski 23,15.
- Piwko P. 1998. *Pedostrangalia pubescens (Fabricius) (Coleoptera: Cerambycidae) – nowy gatunek dla Gór Świętokrzyskich*. Kulon 3: 106.
- Śliwiński Z., Nowakowski E. 1990. *Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Gór Świętokrzyskich*. Frag. Faun. 33: 261-284.

### Adresy autorów:

Mariusz Gwardjan, ul. Lecha 9 m. 29, 25-622 Kielce, e-mail [gwardjan@poczta.onet.pl](mailto:gwardjan@poczta.onet.pl)

Paweł Piwko, ul. Kruszcowa 3 m. 21, 25-705 Kielce

Krzysztof Staroń, ul. Grunwaldzka 41 m. 20, 25-736 Kielce

### CERAMBYCID BEETLES (*Coleoptera: Cerambycidae*) NEW TO THE ŚWIĘTOKRZYSKIE MOUNTAINS

#### Summary

In 1994-1999, six species of cerambycids new to the Świętokrzyskie Mts were recorded: *Nivelia sanguinosa* (Gyllenhal, 1827) - UTM DB 85, *Monochamus sartor* (Fabricius, 1787) - DB 75, *Mesosa curculionoides* (Linnaeus, 1761) - DB 52, *Pogonocherus decoratus* (Fairmaire, 1855) - DB 73, *Pogonocherus fasciculatus* (de Geer, 1775) - *Stenostola dubia* (Laicharting, 1784) - EB 03 and DB 63.